

甘肃省药品监督管理局

甘肃省中药炮制规范

标准号: DB62/PZGF-007-2024

炒 川 芎

Chaochuanxiong

CHUANXIONG RHIZOMA

【处方用名】 炒川芎。

【来源】 本品为伞形科植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort. 的干燥根茎的加工炮制品。主产于四川。夏季当茎上的节盘显著突出，并略带紫色时采挖，除去泥沙，晒后烘干，再去须根。

药材以个大、断面色黄白、质坚实、香气浓郁者为佳。

【炮制方法】 将川芎片置锅内，用文火炒至切面灰黄色至棕褐色，取出，晾凉，筛去碎屑，即得。

【饮片规格】 形如川芎片，厚 2-4mm，表面色泽加深，断面灰黄色至棕褐色，散有棕色小油点（油室），有少量焦斑。

【成品性状】 本品呈不规则的厚片，外表皮淡黑褐色，切面光滑，灰黄色至黑褐色，偶见小油点散布。周边粗糙不整齐，质坚硬。具特异香气，味苦辛，稍有麻舌感，微回甜。

【鉴别】 取本品粉末 1g，加乙醚 20ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取川芎对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典通则 0502) 试验，吸取上述两种溶液各 1~2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯(9:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 6.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【性味与归经】 辛，温。归肝、胆、心包经。

【功能与主治】 活血行气，祛风止痛。用于胸痹心痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，头痛，风湿痹痛。

【用法与用量】 3～10g。

【处方应付】 写炒川芎付炒川芎。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。