

附件：金嗓利咽丸公示稿

金嗓利咽丸（修订内容）

Jinsang Liyan Wan

【制法】 以上十六味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末用炼蜜35~50g加适量的水制丸，干燥，用活性炭包衣制成水蜜丸；或加炼蜜150~170g制成大蜜丸，即得。

【鉴别】 (2) 取本品水蜜丸20g，研碎；或取大蜜丸30g，切碎，加硅藻土15g，研匀。加浓氨试液10ml搅拌湿润，加三氯甲烷100ml，超声处理30分钟，滤过，滤液用盐酸溶液(1→15)30ml振摇提取，提取液用浓氨试液调节pH值至8~9，再用三氯甲烷振摇提取2次，每次30ml，合并三氯甲烷提取液，回收溶剂至干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取槟榔对照药材1g，加三氯甲烷30ml与浓氨试液2ml，超声处理30分钟，滤过，滤液用盐酸溶液(1→50)30ml振摇提取，提取液用浓氨试液调节pH值至8~9，再用三氯甲烷振摇提取2次，每次30ml，合并三氯甲烷液，回收溶剂至干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验，吸取供试品溶液20 μ l、对照药材溶液10 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-浓氨试液(7.5:7.5:0.2)为展开剂，置氨蒸气预饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置碘蒸气中熏至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显一个相同颜色的主斑点。

金嗓利咽丸药品标准修订说明

1. **【制法】** 根据相关证明材料，将泛丸规范为制丸。
2. **【鉴别】** 修订了槟榔的薄层鉴别项。