

升 麻 炭

Shengmatan

本品为毛茛科植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom.、兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim.或升麻 *Cimicifuga foetida* L.干燥根茎的加工炮制品。

【制法】 取升麻片，照炒炭法（《中国药典》2020 年版 四部 通则 0213）炒至表面焦黑色，内部棕褐色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。

【性状】 本品为不规则的厚片，厚 2~4mm。表面焦黑色，可见放射状或不规则网状纹理，内部棕褐色，质脆，有焦糊气，味涩、微苦。

【鉴别】 取本品粉末 1g，加乙醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。取异阿魏酸对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-冰醋酸(7:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 11.0%（《中国药典》2020 年版 四部 通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.5%（《中国药典》2020 年版 四部 通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版 四部 通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 17.0%。

【性味与归经】 涩，平。归胃、大肠经。

【功能与主治】 涩肠止血。用于崩漏，便血。

【用法与用量】 5~10g。

【贮藏】 置通风干燥处。