

# 安徽省药品监督管理局

## 中药配方颗粒标准

AH-YBZ-20212370

### 百蕊草（百蕊草）配方颗粒

Bairuicao Peifangkeli

**【来源】** 本品为檀香科植物百蕊草 *Thesium chinense* Turcz. 的干燥全草经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

**【制法】** 取百蕊草（百蕊草）饮片 3300g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 18%~30%），干燥，加辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

**【性状】** 本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微，味微苦。

**【鉴别】** 取本品研细，取约 0.25g，置具塞锥形瓶中，加乙醚 20ml，超声处理 5 分钟，滤过，弃去滤液，挥干，残渣加甲醇 50ml，超声处理 20 分钟，滤过，取滤液，作为供试品溶液。另取百蕊草（百蕊草）对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取百蕊草素 I 对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（8：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，在 105℃加热约 5 分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

**【特征图谱】** 照高效液相色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0512）测定


色谱条件与系统适用性试验 除检测波长为 330nm 外，其余同【含量测定】项。

**参照物溶液的制备** 取百蕊草（百蕊草）对照药材约 1g，置具塞锥形瓶中，加 50%乙醇 25ml，超声处理 45 分钟，取出，放冷，滤过，滤液作为对照药材参照物溶液。另取[含量测定]项下的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

**供试品溶液的制备** 取【含量测定】项下的供试品溶液，即得。

**测定法** 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 2 $\mu$ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现 5 个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的 5 个特征峰保留时间相对应。与百蕊草素I对照品参照物峰相对应的峰为 S 峰，计算各特征峰与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 范围之内。规定值为 0.195（峰 1）、0.219（峰 2）、0.380（峰 3）、1.158（峰 5）。



对照特征图谱

峰 1：3-O-对羟基肉桂酰奎宁酸；峰 2：5-O-阿魏酰奎宁酸；峰 3：4-O-阿魏酰奎宁酸；峰 4（S）：百蕊草素I；峰 5：山柰酚-3-O-(2''-O- $\alpha$ -鼠李糖-6''-O-丙二酰)- $\beta$ -葡萄糖苷  
谱柱：ACQUITY UPLC BEH shield RP C18（2.1 $\times$ 150mm，1.7 $\mu$ m）

**【检查】** 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（《中国药典》2020 年版通则 0104）。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 23.0%。

**【含量测定】** 照高效液相色谱法（《中国药典》2020 年版通则 0512）测定。

**色谱条件及系统适用性试验** 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为 150mm，内径为 2.1mm，粒径为 1.7 $\mu$ m）；以乙腈为流动相 A，以 0.2%甲酸溶液

为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为 30℃；流速每分钟 0.4ml；检测波长为 270nm。理论板数按百蕊草素I峰计算应不低于 10000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~7	10→13	90→87
7~15	13→16	87→84
15~20	16→21	84→79
20~25	21	79
25~27	21→10	79→90

**对照品溶液的制备** 取百蕊草素I对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 0.6mg 的溶液，即得。

**供试品溶液的制备** 取本品研细，取约 0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 50%乙醇 25ml，称定重量，超声处理（功率 600W，频率 40kHz）45 分钟，取出，放冷，再称定重量，用 50%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。。

**测定法** 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含百蕊草素I（C<sub>16</sub>H<sub>18</sub>O<sub>9</sub>）应为 19.5mg~43.0mg。

**【规格】** 每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.3g

**【贮藏】** 密封。