

隔山消积颗粒

Geshan Xiaoji keli

【处方】 隔山消 200g 马兰草 200g

【制法】 以上二味，快速清洗后干燥，粉碎成粗粉，加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.31~1.34（60℃）的稠膏，加入蔗糖约 950g，混匀，用 80% 乙醇制成颗粒，60℃ 以下干燥，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【鉴别】 （1）取本品 10g，研细，加水 20ml，超声处理 30 分钟，用正丁醇振摇提取 2 次，每次 20ml，合并提取液，蒸干，残渣加乙醇 1ml 溶解，作为供试品溶液。另取隔山消对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-正丁醇（18：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品 10g，研细，加甲醇 50ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取马兰草对照药材 2g，加水煎煮 30 分钟，滤过，滤液浓缩至干，残渣加甲醇 20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-甲酸（10：1：0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 版通则 0104）。

【含量测定】 取装量差异项下的本品，混匀，研细，取约 2.5g，精密称定，置 150ml 圆底烧瓶中，加 7% 硫酸乙醇溶液 25ml（取浓硫酸 35ml 缓缓倒入适量 40% 乙醇溶液中，放冷后，加 40% 乙醇至 500ml，即得），置沸水浴中加热回流 5 小时，取出，放冷，加水 50ml，摇匀，用干燥至恒重的 4 号垂熔玻璃漏斗滤过，沉淀用水洗涤至滤液不显酸性，在 105℃ 干燥至恒重，精密称定重量，计算，即得。

本品每袋含总皂苷以总皂苷元计，不得少于 27mg。

【功能与主治】 苗医：洗侬，冒登：阿套穷，吉里打底抡，蒙抡得衣盎扣，蒙逢秋，底抡，加嘎。

中医：消积行气。用于脾胃气滞所致的食积内停，脘腹胀痛，不思饮食，噎腐吞酸。

【用法与用量】 口服。一次 10~20g，一日 3 次。

【规格】 每袋装 10g（每 1g 相当于饮片 0.4g）

【贮藏】 密封。