

甘肃省药品监督管理局

甘肃省中药材标准

标准号: DB62/YCBZ-006-2024

红娘子

Hongniangzi

HUECHYS

本品为蝉科昆虫黑翅红娘子 *Huechys sanguinea* De Geer 的干燥体。6~8月间，朝露未干时捕捉，蒸死，晒干或烘干。

【性状】 本品呈长圆形，尾部较狭。头黑嘴红，复眼大而突出。颈部棕黑色，两肩红色，翅黑棕色足3对，多已脱落，腹部红色，可见有8个环节，尾部尖。质松而轻，剖开后可见体内呈淡黄色。气微臭。

【鉴别】 取本品粉末0.5g，加甲醇15ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml 使溶解作为供试品溶液。另取丙氨酸对照品，加水制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。再取红娘子对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。。照薄层色谱法(中国药典通则0502)试验，吸取上述供试品溶液6 μ l、对照品溶液1 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水(4:1:1)为展开剂，展距10~12cm，取出，晾干，喷以茚三酮试液。在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过11.0%（中国药典通则0832第二法）。

总灰分 不得过10.0%（中国药典通则2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(中国药典通则2201)项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于15.0%。

饮片

【炮制】 米炒红娘子 取红娘子，与米拌炒，至米呈焦黄色，虫体表面带火色时，取出，除去头、足、翅，放凉。

【性状】 本品表面老黄色，质松脆，折断体内呈淡黄色至黄色，微臭。

【性味与归经】 苦、辛，平；有大毒。归心、肝、胆经。

【功能与主治】 破瘀逐瘀，攻毒散结。外用恶疮，瘰癧，疥癣。

【用法与用量】 0.15~0.30g。外用适量，研末作饼敷贴。

【注意】 本品有大毒，内服宜慎。气血虚弱，无瘀滞者及孕妇忌服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。