

修订草案公示稿

六味枸杞口服液

Liuwei Gouqi Koufuye

【处方】 枸杞子 200g 天冬 100g 西藏棱子芹 100g
黄精 100g 茅膏菜 100g 喜马拉雅紫茉莉 100g

【制法】 以上六味，加水煎煮二次，每次 40 分钟，滤过，滤液浓缩，放冷，加入乙醇至含醇量达 60%，静置 24 小时，滤过，滤液回收乙醇至无醇味，加入单糖浆，加水调整总量至 1000ml，滤过，分装，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕红色至棕褐色液体；味甘，微苦。

【鉴别】 1、取本品 20ml，加乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，浓缩至 2ml，作为供试品溶液。另取枸杞子对照药材 2g，加水 40ml，煮沸 40 分钟，滤过，滤液用乙酸乙酯同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G 薄层板上，以苯-乙酸乙酯-甲酸（4：1：0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的蓝色荧光斑点。

2、取本品 40ml，加水 20ml，摇匀，加石油醚（60-90 $^{\circ}$ C）提取 2 次，每次 30ml，合并石油醚液，静置 10 分钟后离心再取上清液，挥干，残渣加甲醇溶解至 0.5ml，作为供试品溶液。另取西藏棱子芹对照药材 2g，加甲醇 20ml，40 $^{\circ}$ C 水浴温浸 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇溶解至 0.5ml，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 H 薄层板上，以三氯甲烷-正己烷-乙酸乙酯-甲酸（7:10:3:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

3、取（鉴别）1 项下供试品溶液，作为供试品溶液。另取茅膏菜对照药材 1g，加入甲醇 20ml，40 $^{\circ}$ C 水浴温浸 30 分钟，滤过，滤液浓缩至 2ml，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G 薄层板上，以苯-乙酸乙酯-冰乙酸（7：1：0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应

的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.08（中国药典 2020 年版通则 0601）。

pH 值 应为 4.0~5.5（中国药典 2020 年版通则 0601）。

其它 应符合合剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 年版通则 0181）。

【功能与主治】 补“旅送”，益气养血。用于柏龙型贫血及缺铁性贫血，失血性贫血所致的身体虚弱，面色萎黄，头晕眼花，心悸失眠等症。

【用法与用量】 口服，一次 10ml，一日 3 次。

【规格】 每支装 10ml

【贮藏】 密封，置阴凉处。

起草单位：西藏甘露藏药股份有限公司

复核单位：西藏自治区食品药品检验研究院

公示稿